

Отпускается из аптеки без рецепта врача. Перед применением следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

#### Форма выпуска

Раствор для внутреннего применения 25, 50 и 100 мл укомплектован мерным стаканчиком

Пастилки (ромбовидные таблетки) № 20

#### Состав

В растворе — сок, в пастилках — высушенный сок свежей цветущей эхинацеи пурпурной.

#### Фармакотерапевтическая группа

Неспецифический иммуностимулятор.

#### Фармакологические свойства

Увеличивает количество иммунокомпетентных клеток (в том числе лимфоцитов), усиливая естественную защиту организма. Также оказывает противовоспалительное действие.

# Эхинацин®

*Эффективное лечение  
ослабленного иммунитета*



#### Показания к применению

В составе комплексного лечения острых и хронических инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей и нижних отделов мочевыводящих путей; вторичных иммунодефицитных состояний различного происхождения (инфекции, радиация, химиотерапия). Монотерапия для профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, иммунодефицита при длительном приеме антибиотиков. Оздоровление лиц, перенесших воздействие радиации или проживающих в зонах неблагоприятных по радиационному уровню.

#### Способ применения и дозы

Раствор для приема внутрь следует разбавлять или запивать водой: детям до 6 лет — 1,25 мл 3 раза в день, до 12 лет — 2 мл 3 раза в день, старше 12 лет и взрослым — 2,5 мл 3 раза в день. Пастилки следует рассасывать во рту: детям до 12 лет 2 — 3 пастилки в день, взрослым — 4 пастилки в день. Решающее значение имеет раннее применение препарата, т. е. при первых симптомах инфекции, например, першении в горле. Полезно начинать с ударной дозы: в первый день — 2,5 мл, затем 1,25 мл каждые 1 — 2 часа, далее 3 раза ежедневно по 2,5 мл. Продолжительность лечения: не дольше 2 недель.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т. ч. к растениям семейства сложноцветных), системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, СПИД и ВИЧ-инфекция, системная красная волчанка, онкологические заболевания). Не влияет на эффективность других препаратов при совместном применении. Данные относительно применения препарата в период беременности, кормления грудью и у детей в возрасте до 4-х лет отсутствуют.

#### Побочные действия

Хорошо переносится, риск аллергии очень низкий. В редких случаях сыпь, зуд, местный отек лица, затрудненное дыхание, головокружение, гипотония.