

Отпускается из аптеки без рецепта врача. Перед применением следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Показания к применению

Гель:

травмы с ушибами, растяжениями, ущемлениями, вывихами, гематомами;

тендовагинит;

болевого синдром, связанный с заболеваниями позвоночника (люмбаго, ишиалгия, длительная боль, выпадение межпозвоночного диска);

артралгия и миалгия при ревматологических заболеваниях;

флебит поверхностных вен, тромбоз флебит, варикозное расширение вен;

для лечения местных осложнений после внутривенных инъекций или инфузий (профилактика развития гематом).

Спрей:

при спортивных, бытовых травмах, растяжениях и кровоизлияниях, при травмах у детей во время игр.

Форма выпуска

Гель 40 г и спрей 200 мл

Состав

Содержание действующих веществ в 100 г геля: эсцин — 1 г, диэтиламина салицилат — 5 г. Содержание действующих веществ в 200 мл спрея: D-камфора — 0,07 г, L-ментол — 0,18 г.

Репарил®-спрей и Репарил®-гель Н

Эффективное обезболивание и снятие отечности



Фармакологические свойства

Компоненты геля

Эсцин, биологически активное вещество из конского каштана, проникая сквозь кожу, уменьшает локальный отек, боль, напряженность ткани. Эффективно устраняет воспалительные процессы. Диэтиламина салицилат усиливает противовоспалительный эффект и проявляет выраженное обезболивающее действие.

Компоненты спрея

D-камфора улучшает региональную микроциркуляцию. Противоболевое и противозудное действие связано с тем, что камфора, как и ментол, избирательно активирует холодовые рецепторы. Под влиянием камфоры суживаются периферические сосуды и уменьшается отечность тканей.

Способ применения и дозы

Необходимое количество геля наносят на место повреждения 1–3 раза в сутки, равномерно распределяя по всей поверхности. Гель быстро всасывается через кожу, втирать в кожу нет необходимости. Спрей распыляется на болезненный участок.

Противопоказания

Не следует наносить на раны, слизистые оболочки и на участки кожи, которые подверглись облучению. Гиперчувствительность к салицилатам, эсцину или другим компонентам препарата.

Указания: долговременное лечение на больших поверхностях не рекомендуется во время беременности и в период кормления. Также в период кормления не рекомендуется применение в области груди.

Побочные эффекты

В редких случаях возможны кожные аллергические реакции в виде покраснения, зуда или высыпаний. Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не установлено.