

Спазмо-лит®

*Эффективное лечение
недержания мочи*



Отпускается из аптеки по рецепту врача. Перед применением следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой №20.

Состав

Троспия хлорид 20 мг

Фармакотерапевтическая группа

Спазмолитик, действующий на мочевые пути.

Фармакологические свойства

Расслабляет гладкую мускулатуру мочевого пузыря: увеличивается его объем, что снижает частоту позывов к мочеиспусканию. Не влияет на функцию других органов.

Способ применения и дозы

Длительность лечения врач устанавливает индивидуально. Обычно курс не превышает 3 недели. Принимают по 1 таблетке 2 раза в день. Интервал между приемами должен составлять не менее 8 часов.

Показания к применению

Нарушение функции мочевого пузыря негормонального и неорганического происхождения (недержание мочи), в том числе при нагрузке, обусловленной кашлем, смехом, чиханием или физической нагрузкой.

Дизурические нарушения (частое мочеиспускание, в том числе в ночное время, энурез, неудержимое мочеиспускание без позыва).

Рекомендован экспертной группой ВОЗ для лечения гиперактивного мочевого пузыря (ГМП).

Противопоказания

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, глаукома, тахикардия, миастения, кишечная непроходимость, тяжелые нарушения функции почек, печени, инфекции мочевыводящих путей, возраст до 18 лет, беременность и кормление грудью.

Побочные эффекты

Сухость во рту. Очень редко тахикардия, нарушение аккомодации, головокружение, вялость или возбуждение, задержка мочи, нарушение стула, уменьшение потоотделения.